

nerwowego i tworzą się w życiu płodowym. Ślina ma właściwości przyspieszające proces gojenia się, ponieważ nie tylko pobudza procesy zapalne do regeneracji tkanki, lecz także zawiera biochemiczne substancje zdolne do wspomaganie zablizniania się ran [201].

Doświadczenie kliniczne wskazuje, że blizna na dziąśle może dawać różnorakie objawy z powodu unerwienia układu trójdzielnego. Mogą one powodować ból w miejscu zabiegu lub na odległych obszarach albo powodować problemy z postawą, czego przyczyną są powiązania nerwu trójdzielnego z całym organizmem [22, 23].

Na rycinie 9.1a przedstawiono bliznę po uszkodzeniu błony śluzowej jamy ustnej w wyniku chirurgicznego usunięcia cysty. Terapeuta może leczyć bliznę na dziąśle, wsuwając palec w rękawiczce do jamy ustnej i umieszczając go w miejscu wykonanego zabiegu (ryc. 9.1b). Metody stosowania są takie same jak w przypadku osteopatycznych technik pośrednich.

Rekonstrukcyjna chirurgia plastyczna zajmuje się wszystkimi obszarami twarzy, ich naprawą po uszkodzeniu lub zwyczajnie zmianą jej fizjonomii [202, 203]. Z zewnątrz



Rycina 9.2. Leczenie manualne: jeden palec terapeuty umieszczony jest w jamie ustnej na operowanym obszarze, a drugi na operowanej kości na zewnątrz.